Piano Aziendale delle Cronicità

Percorsi clinico- assistenziali di cura
della persona affetta da malattia cronica

ALLERGIA RESPIRATORIA PEDIATRICA

Sommarrio

Percorso clinico- assistenziale di cura per la patologia respiratoria allergica nel bambino	pag.4
Obiettivi	Pag.4
Inquadramento Patologia	Pag.4
Definizioni e Terminologia	pag.4
Acronimi	pag.5
ICD 9 CM Diagnosi e procedure	pag.6
Codice esenzione malattie croniche e invalidanti DM 329/99 e successive modifiche : 007	pag.7
Cenni di epidemiologia	pag.8
Linee Guida e Letteratura Scientifica di riferimento	pag.8
Ragionamento Clinico	pag.9
IL PCA nella ASL di Rieti	pag.19
Flow Chart A: PCA Allergia respiratoria pediatrica, Ragionamento clinico, Reclutamento pazienti	pag. 21
Legenda Flow Chart A: PCA Allergia respiratoria pediatrica, Ragionamento Clinico. Reclutamento pazienti	pag.22
Flow Chart Organizzativa PCA Allergia respiratoria pediatrica – Reclutamento pazienti	pag. 24
Note flow-chart organizzativa, PCA Allergia respiratoria pediatrica reclutamento pazienti	pag. 25
Flow Chart B: PCA Allergia respiratoria pediatrica, Ragionamento Clinico, Percorso a Bassa Complessità Assistenziale (BCA)	pag. 27
Legenda Flow Chart B: PCA Allergia respiratoria pediatrica, Ragionamento clinico, Percorso a Bassa Complessità Assistenziale (BCA)	pag. 28
Flow Chart Organizzativa, PCA Allergia respiratoria pediatrica, Percorso a Bassa Complessità Assistenziale (BCA)	pag. 31
Note flow chart BPCA Allergia respiratoria pediatrica, ragionamento organizzativo percorso a bassa complessità assistenziale (BCA)	pag. 32

Flow Chart C: PCA Allergia respiratoria pediatrica - Ragionamento Clinico Percorso a Media Complessità Assistenziale (MCA)	pag. 33
Legenda Flow Chart C: PCA Allergia respiratoria pediatrica, Ragionamento Clinico, Percorso a Media Complessità Assistenziale (MCA)	pag. 34
Flow Chart Organizzativa, PCA Allergia respiratoria pediatrica, Percorso a Media Complessità Assistenziale MCA	pag. 35
Note flow chart c: PCA Allergia respiratoria pediatrica, ragionamento organizzativo, percorso a media complessità assistenziale (MCA)	pag. 36
Flow Chart D: PCA Allergia respiratoria pediatrica, Ragionamento Clinico, Percorso a Alta Complessità Assistenziale (ACA)	pag. 37
Legenda Flow Chart D: PCA Allergia respiratoria pediatrica, Ragionamento Clinico, Percorso a Alta Complessità Assistenziale (ACA)	pag. 38
Flow Chart Organizzativa, PCA Allergia respiratoria pediatrica, Percorso a Alta Complessità Assistenziale (ACA)	pag. 39
Note flow chart d: PCA Allergia respiratoria pediatrica, ragionamento organizzativo, percorso a alta complessità assistenziale (ACA)	pag. 40
FLOW CHART E: PCA Allergia respiratoria pediatrica, Ragionamento Clinico, Percorso in regime ospedaliero (HCA)	pag. 41
Legenda Flow Chart E: PCA Allergia respiratoria pediatrica, Ragionamento Clinico, Percorso in regime ospedaliero (HCA)	pag. 42
Flow Chart Organizzativa, PCA Allergia respiratoria pediatrica, Percorso in regime ospedaliero (HCA)	pag. 43
Note flow chart E: PCA Allergia respiratoria pediatrica, ragionamento organizzativo, percorso in regime ospedaliero (HCA)	pag. 44
PCA Allergia respiratoria pediatrica indicatori di struttura, processo ed esito	pag. 45

PERCORSO CLINICO- ASSISTENZIALE DI CURA PER LA PATOLOGIA RESPIRATORIA ALLERGICA NEL BAMBINO

Obiettivi

L' asma è una delle patologie con cui il Pediatra è chiamato a confrontarsi più di frequente nella sua attività clinica. L'attuale letteratura evidenzia come si debba pensare ad una unità delle vie aeree che inizia con il naso e termina con i polmoni. Pertanto la gestione corretta dell'asma non può prescindere da un adeguato inquadramento della patologia respiratoria del bambino allergico. Da tale premessa è nata l'esigenza di creare un percorso che consenta al pediatra di famiglia di riconoscere i sintomi e di inviare il paziente ad un team multi specialistico in grado di assicurare una corretta diagnosi ed una adeguata assistenza. Il piano vuole anche standardizzare il giusto approccio terapeutico all'asma così da evitare il ricorso incongruo in ospedale per ricevere cure primarie.

Inquadramento Patologia

L'asma è una malattia eterogenea caratterizzata da una infiammazione cronica delle vie aeree.

Essa è definita dalla storia di sintomi respiratori quali respiro sibilante, mancanza di respiro, senso di costrizione toracica e tosse che variano nel tempo e di intensità con limitazione reversibile del flusso aereo respiratorio. Si tratta di una patologia di grande impatto sulla popolazione e rappresenta una notevole fonte di costi sia sociali che umani. Circa la metà sono costi diretti dell'asma (visite mediche, ricoveri, terapie) mentre il resto della spesa è rappresentata dai costi indiretti come ad esempio perdita di giornate di lavoro o di frequenza scolastica.

Definizioni e Terminologia

L'Allergia respiratoria pediatrica ha caratteristiche peculiari che sono legate alle differenti età del paziente ed ai diversi fenotipi: wheezing virale episodico e wheezing multi trigger.

La diagnosi di asma in età pediatrica inizia con una storia di episodi ricorrenti di respiro sibilante (almeno tre).

I sintomi tipici per una definizione della diagnosi includono: episodi ricorrenti di tosse, respiro sibilante, difficoltà nella respirazione o senso di costrizione toracica, provocati dall'esposizione a vari stimoli come sostanze irritanti, allergeni, infezioni respiratorie, esercizio fisico, stati emotivi.

Una storia personale di atopìa e una storia familiare di atopìa rinforzano la diagnosi.

Tenendo conto dell'età del paziente, dell'assenza di sintomi patognomici e della frequente sovrapposizione con patologia infettive la diagnosi di asma in età pediatrica è spesso difficile, richiede una diagnosi differenziale e deve essere supportata da test strumentali .

In letteratura sono considerate fondamentali le seguenti prove di funzionalità respiratoria:

- Spirometria nei bambini >5 anni o la determinazione delle resistenze respiratorie con la tecnica delle interruzioni (RINT) per i bambini non collaboranti;

- Test di reversibilità bronchiale (incremento FEV1>12% rispetto al basale);
- Test da sforzo applicabile in età pediatrica anche se richiede adeguata collaborazione e tempo.

Altri test che trovano applicazione in letteratura nella fase diagnostica differenziale e/o nel follow up sono la misura dell'ossido nitrico esalato(FENO), lo studio della citologia nasale e la ph-impedenziometria esofagea.

La terapia dell'Allergia respiratoria pediatrica varia in funzione della sua gravità e prevede fasi di step up e step down in base all'andamento clinico.

La farmacoterapia ha l'obiettivo di assicurare il controllo dei sintomi e ridurre il rischio per la futura morbilità. Tutti i pazienti reclutati risolto l'episodio acuto dovranno essere classificati in gruppi con diversi livelli di gravità e sottoposti a controllo periodici.

L'unica terapia in grado di cambiare la storia naturale della malattia è l'immunoterapia allergene specifica.

Fondamentale è l'educazione del paziente e dei genitori a gestire in modo ottimale la malattia in collaborazione con gli operatori sanitari. L'istruzione e la formazione di una alleanza terapeutica sono cruciali per l'attuazione e il successo del piano di trattamento.

Acronimi

PCA	Percorsi clinico- assistenziali
ACA	Alta Complessità assistenziale
BCA	Bassa Complessità assistenziale
CRD	Component Resolved Diagnosis
DEA	Dipartimento d'Emergenza e Accettazione
FENO	Valutazione dell'Ossido Nitrico Esalato
FEV1	Forced Expiratory Volume in 1 second
HCA	Assistenza in Regime Ospedaliero
ISAAC	International Study on Asthma and Allergy in Childhood
MCA	Media Complessità assistenziale
MMG	Medico Medicina Generale
NARESMA	Rinite non allergica eosinofilo-mastocitaria
OBIP	Osservazione Breve Intensiva Pediatrica
OMS	Organizzazione Mondiale della Sanità
ORL	Otorinolaringoiatra
PLS	Pediatra di Libera Scelta
PS	Pronto Soccorso
RINT	Tecnica dell'interruzione di flusso
SIDRIA	Studi Italiani sui Disturbi Respiratori dell' Infanzia e Ambiente
SIP	Società Italiana di Pediatria

SPEC.TERR.	Specialista Territoriale
SPT	Skin Prick Test
UOSD	Unità Operativa Semplice Dipartimentale

ICD 9 CM Diagnosi

("International classification of Diseases – 9 th revision – Clinical Modification" 2007 versione italiana)

<i>Codice¹ ICD9 CM</i>	<i>Diagnosi</i>
493	Asma
493.90	Asma non specificato
493.91	Con stato asmatico
493.92	Con peggioramento (acuto)
477.9	Rinite allergica

¹Per una codifica più dettagliata delle diagnosi è necessario utilizzare i codici a cinque cifre.

ICD 9 CM Procedure

("International classification of Diseases – 9 th revision – Clinical Modification" 2007 versione italiana)

<i>Codice² ICD9 CM</i>	<i>Procedure</i>
89.01	Anamnesi e valutazione definite brevi
89.7	Visita generale (Specialistica)
89.06	Consulto definito limitato
86.19	Altre procedure diagnostiche su cute e tessuto sottocutaneo
89.37	Spirometria
31.42	Rinofibroscopia
93.96	Ossigenoterapia
91.90.4	Screening allergologico per inalanti e alimenti (Prick Test).Fino a 18 allergeni.
93.82.3	Terapia educativa del paziente asmatico/allergico con rischio anafilattico-Seduta individuale

²Per una codifica più dettagliata delle procedure è necessario utilizzare i codici a quattro cifre.

Codice esenzione malattie croniche e invalidanti DM 329/99 e successive modifiche : 007

ASMA

PRESTAZIONI

- VISITA DI CONTROLLO necessaria al monitoraggio della malattia, delle complicanze più frequenti ed alla prevenzione degli ulteriori aggravamenti (* NOTA)
- 90.62.2 EMOCROMO: ESAME CITOMETRICO E CONTEGGIO LEUCOCITARIO DIFFERENZIALE Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV. Compreso eventuale controllo microscopico
- 91.49.2 PRELIEVO DI SANGUE VENOSO
- 91.90.4 SCREENING ALLERGOLOGICO PER INALANTI E ALIMENTI [Prick test]. Fino a 18 allergeni.
- 93.82.3 TERAPIA EDUCAZIONALE DEL PAZIENTE ASMATICO/ ALLERGICO CON RISCHIO ANAFILATTICO. Seduta individuale.
- 89.52 ELETTROCARDIOGRAMMA
- 89.37.1 SPIROMETRIA SEMPLICE. Non associabile a 89.37.4
- 89.37.2 SPIROMETRIA GLOBALE (con tecnica di diluizione, pletismografia o altra metodica)
- 89.37.4 TEST DI BRONCODILATAZIONE FARMACOLOGICA. Spirometria basale e dopo somministrazione di farmaco. Non associabile a SPIROMETRIA SEMPLICE (89.37.1) SPIROMETRIA GLOBALE (89.37.2). Incluso farmaco.
- 89.65.5 MONITORAGGIO INCRUENTO DELLA SATURAZIONE ARTERIOSA / PULSOSSIMETRIA
- 90.72.3 PROTEINA C REATTIVA (quantitativa)

* NOTA: il prescrittore identifica la tipologia di visita richiesta ed il relativo codice tra quelli presenti nel nomenclatore della specialistica ambulatoriale

Cenni di epidemiologia

L'asma è la malattia cronica più frequente in età pediatrica e rappresenta, pertanto un importante problema di sanità pubblica.

Nello studio SIDRIA -2 nell'ambito di uno studio internazionale del 2002 (ISAAC) a cui hanno partecipato 13 centri italiani è stata evidenziata in Italia una prevalenza medio-bassa per i disturbi respiratori. Le più alte prevalenze sono risultate nelle aree centrali italiane e nelle metropoli. In 12 mesi la prevalenza di accessi in PS è stata del 10% dei bambini e ragazzi con asma corrente e circa il 3% è stato ricoverato. Oltre il 30% dei ragazzi asmatici è stato ricoverato almeno una volta. I figli di famiglie con livello più basso di istruzione presentano un numero statisticamente maggiore di ricoveri in ospedale per asma.

Secondo la *Global Initiative for Asthma* (GINA) sono addirittura 300 milioni le persone nel mondo affette da asma. Secondo i dati OMS le morti per asma sono 180 mila ogni anno.

Linee Guida di riferimento

- *Global Initiative for Asthma*, revisione 2017;
- International ERS/ATS guidelines on definition, evaluation and treatment of severe asthma. Kian Fan Chung et Al. Eur. resp. J. 2014
- American Thoracic Society Documents An Official American Thoracic Society Clinical Practice Guideline: Exercise-induced Bronchoconstriction. December 2012
- British Guideline on the Management of Asthma A national clinical guideline 2012
- PRISMA (PROspective Study on asthMA control) Study Group, Real-life prospective study on asthma control in Italy: cross-sectional phase results. Allegra L. et Al; Respir Med. 2012.
- Innate and adaptive immune responses in asthma. Holgate ST. Nat. Med 2012.
- *La gestione dell'attacco acuto di asma in età pediatrica*. Linee guida della Società Italiana di Pediatria (2016).
- Consensus internazionale sull'asma in età pediatrica (ICON)- 2017.

Ragionamento Clinico

Nel sospetto clinico di asma, anamnesi (fattori di rischio), sintomi (tosse, dispnea, intolleranza allo sforzo) e segni (sibili) è fondamentale effettuare una spirometria con test di broncodilatazione (per i pazienti non collaboranti l'oscillometria ad impulsi – IOS). In assenza di ostruzione bronchiale, ma con sintomi suggestivi per asma, la diagnosi può essere formulata in base al test di broncostimolazione (metacolina, esercizio fisico) che valuta il grado di iperreattività bronchiale. In caso di negatività del test di broncostimolazione bisogna valutare diagnosi alternative all'asma per cui si rendono necessarie ulteriori indagini (rx torace, misura dei volumi polmonari statici e della diffusione alveolo-capillare, etc.).

La spirometria

È un test fisiologico che misura i volumi di aria inspirata ed espirata da un individuo in funzione del tempo. Essa ha un valore inestimabile come test di screening della salute respiratoria così come la pressione arteriosa fornisce importanti informazioni su quella cardiovascolare.

È ampiamente utilizzata nella valutazione dei pazienti con sintomi respiratori e consente di individuare la presenza di difetti della ventilazione; in particolare consente di distinguere il tipo di difetto ventilatorio (ostruttivo o restrittivo) e di valutarne la gravità.

Il monitoraggio domiciliare del Picco di Flusso Espiratorio (PEF) può essere utile nei pazienti con scarsa percezione dei sintomi per valutare la gravità dell'asma e identificare i fattori scatenanti.

La registrazione dei sintomi è fondamentale non solo per la diagnosi ma anche per valutare il controllo clinico della malattia. Il test di controllo dell'asma (Asma Control Test-ACT) è il più semplice dei questionari testati, con buona correlazione con il giudizio clinico.

Classificazione di gravità

Si ottiene attraverso una valutazione combinata della frequenza dei sintomi diurni e notturni, della presenza di limitazioni nella vita quotidiana, della misurazione del FEV1 o della variabilità giornaliera del PEF.

Classificazione di gravità: Caratteristiche cliniche in assenza di terapia

	Sintomi	Sintomi notturni	FEV₁ o PEF
STEP 4 Grave Persistente	Continui Attività fisica limitata	Frequenti	FEV ₁ ≤ 60% predetto Variabilità PEF > 30%
STEP 3 Moderato Persistente	Quotidiani Attacchi che limitano l'attività	> 1 volta alla settimana	FEV ₁ 60-80% predetto Variabilità PEF > 30%
STEP 2 Lieve Persistente	> 1 volta/settimana ma < 1 volta/giorno	> 2 volte al mese	FEV ₁ ≥ 80% predetto Variabilità PEF 20-30%
STEP 1 Intermittente	< 1 volta/settimana	≤ 2 volte al mese	FEV ₁ ≥ 80% predetto Variabilità PEF < 20%

Identificazione dei fattori scatenanti:

- Allergeni skin prick test (I° livello) e dosaggio delle IgE specifiche sieriche (II° livello)
- Rinosinusite (TC seni paranasali)
- RGE (EGDS, pHmetria esofagea)
- Intolleranza ad aspirina (TPB specifico inalatorio) e a conservanti alimentari
- Allergia alimentare (che anche se rara è una forma particolarmente pericolosa in quanto può essere associata ad asma grave scatenato da sforzo fisico)
- Rischio ambientale (ambiente scolastico)

Fenotipi

- Asma allergico (causato da inalanti, alimenti o da farmaci)
- Asma non allergico
- Asma ad esordio tardivo
- Asma con limitazione fissa del flusso aereo
- Asma con obesità
- Non identificato, da esercizio fisico, da infezioni virali, da molteplici fattori scatenanti

Terapia

Il ciclo di trattamento dell'asma basato sul controllo:

I farmaci antiastmatici sono tradizionalmente divisi in farmaci per il controllo dell'asma e farmaci per il controllo dei sintomi.

- Farmaci per il controllo dell'asma: corticosteroidi inalatori (CSI), CSI + beta 2-agonisti a lunga durata d'azione (LABA), antagonisti recettoriali dei leucotrieni, anti-IgE.
- Farmaci per il sollievo dei sintomi: beta 2-agonisti a rapida azione (SABA), corticosteroidi sistemici, anticolinergici a breve durata d'azione (Ipratropium bromuro).

Un approccio progressivo (*step*) alla terapia farmacologica è consigliato, scegliendo le opzioni migliori per quel paziente all'interno del livello di terapia prescelto sulla base della gravità o del livello di controllo (*step-up* o *step-down*).

Se il paziente risulta controllato da almeno 3-6 mesi, favorire lo *step-down*:

- Ridurre la dose del corticosteroide inalatorio (CSI) nella combinazione;
- Passare da una combinazione a bassa dose a una singola somministrazione giornaliera;
- Passare infine alla monoterapia con CSI a bassa dose;

- Tentare la completa sospensione del trattamento solo dopo un anno di completa remissione della malattia.

Se il paziente non ha raggiunto il controllo della malattia bisogna modificare la terapia utilizzando farmaci consigliati per quel determinato stadio (*step-up*) e successiva rivalutazione a 3 mesi.

Indicatore di appropriatezza prescrittiva: farmaci vengono prescritti nel rispetto delle loro indicazioni registrate e in base allo stadio di gravità.

Il monitoraggio della malattia è essenziale per raggiungere il controllo.

I pazienti dovrebbero essere rivisti almeno entro 3 mesi dopo la visita iniziale, e successivamente ogni 3- 6 mesi in base alla gravità della malattia.

Alla visita di follow-up (dopo circa 3 mesi), dovrebbe essere valutato il livello di controllo dell'asma, sulla base dei seguenti elementi:

- Frequenza dei sintomi diurni e notturni;
- Utilizzo del farmaco al bisogno;
- Limitazioni nella vita quotidiana;
- Numero e gravità delle riacutizzazioni.

Livelli di Controllo dell'Asma

Caratteristiche	Totalmente controllato (tutti i criteri seguenti)	Ben controllato (qualsiasi criterio presente in qualsiasi settimana)	Non controllato
Sintomi giornalieri	Nessuno (≤ 2 /settimana)	>2 volte/settimana	≥ 3 criteri di asma parzialmente controllato presenti in qualsiasi settimana
Limitazione delle attività	Nessuna	Qualche	
Sintomi notturni/risvegli	Nessuno	Qualche	
Necessità di farmaci al bisogno	Nessuna (≤ 2 /settimana)	>2 volte/settimana	
Funzionalità polmonare (PEF o FEV₁)[§]	Normale	<80% del predetto o del migliore valore personale (se noto)	
Riacutizzazioni	Nessuna	≥ 1 /anno*	1 in qualsiasi settimana [†]

Dopo una riacutizzazione il follow-up dovrebbe essere programmato entro 2-4 settimane.

L'asma con ostruzione non più completamente reversibile si associa a sintomi cronici persistenti (dispnea da sforzo).

Le riacutizzazioni asmatiche in età pediatrica

Bisogna definire il livello di gravità di ogni riacutizzazione in quanto la strategia d'intervento sarà diversa.

Nella gestione delle riacutizzazioni assumono importanza fattori di valutazione come la funzione respiratoria (PEF, spirometria, pulsossimetria), il livello di terapia, la risposta alla terapia ed ha come obiettivo principale quello di indicare quali pazienti hanno necessità di ricovero.

Livelli di severità delle riacutizzazioni asmatiche

- **A rischio di morte**

PEF < 33%
SpO₂ < 92%
Torace silente
Cianosi
Bradycardia/aritmie
Ipotensione
Sensorio obnubilato
Sfinimento

- **Grave**

PEF 33 - 50%
FR ≥ 25 apm
FC ≥ 110 bpm
Incapacità a completare una frase nell'arco di un respiro

- **Lieve-Moderata**

Peggioramento dei sintomi
PEF 50 - 75%

Il trattamento delle riacutizzazioni lievi-moderate

Il trattamento delle riacutizzazioni gravi

Valutazione della severità dell'esacerbazione.

	Lieve	Moderata	Grave		Molto grave
Sibilo	Variabile	Moderato o forte	Forte, udibile in inspirio ed espirio		Spesso non udibile
Respiro corto	Camminando	A riposo		A riposo/seduto	
Eloquio	Frase compiute	Frase	Parole		Impossibile
Utilizzo muscoli accessori	No	Comune	Marcato		Paradosso
Livello di coscienza	Non alterata	Non alterata			
Frequenza respiratoria	Leggermente aumentata	Aumentata	Molto aumentata		Non valutabile
Frequenza cardiaca	< 100	< 140 (in relazione all'età)	> 140		Bradycardia
PEF (% del predetto o del miglior valore personale)	> 60-70	40-70	40		< 25
Saturazione O2 (% in aria)	> 94-95	90-95			< 90
PCO2 (mmHg)	< 42	< 42			≥ 42

Una riacutizzazione grave è indice di scarso controllo della malattia e richiede pertanto che, una volta risolta, il paziente venga rivalutato in ambito specialistico allo scopo di evidenziare i fattori responsabili dello scarso controllo (mancanza di aderenza al trattamento, modalità di uso degli inalatori, persistente esposizione a fattori scatenanti, presenza di comorbidità o di fattori aggravanti la malattia).

La prevenzione delle riacutizzazioni deve prevedere una strategia d'intervento articolata in più punti:

- Terapia di mantenimento mirata al controllo dell'asma;
- Step-up tempestivo della "perdita di controllo";
- Terapia di mantenimento eventualmente "aggiustata" sugli indicatori di infiammazione bronchiale (ossido nitrico esalato, feno);
- Programma educativo personalizzato;
- Abbattimento/mitigazione dei fattori di rischio individuati (allergeni, inquinanti, altro);
- Vaccinazione antinfluenzale;
- Identificazione dei pazienti a maggior rischio di riacutizzazioni;
- Calo ponderale in caso di obesità;
- Follow-up in ambito specialistico per le riacutizzazioni gravi.

Fattori di rischio

Fattori Individuali

Predisposizione genetica
Atopia
Iperreattività bronchiale
Obesità

Genere
Etnia
Età

Fattori Ambientali

Allergeni
Allergeni professionali
Fumo di tabacco
Inquinamento atmosferico e condizioni climatiche
Infezione delle vie aeree
Abitudini alimentari
Farmaci
Fattori socio-economici e stili di vita
Stress e fattori psico-sociali

Fattori di rischio in relazione all'età

Prenatale	Adulto
Fumo madre e nonna	Proseguimento età infantile
Alimentazione	Allergeni professionali
Stress, ansietà	Farmaci
Fattori genetici e interazione con ambiente	Procedure anestesilogiche
Modalità parto	Fumo
Farmaci (antibiotici)	Atopia
Infantile	Anziano
Allattamento materno	Inquinamento atmosferico e ambientale
Fumo	Condizioni microclimatiche
Ridotto calibro vie aeree	Fattori psicosociali: stress
Status socio-economico	Proseguimento età adulta
Numerosità del nucleo familiare	Cambiamenti fisiologici dell'apparato polmonare
Infezioni virali	Inquinamento atmosferico e ambientale
Esposizione a pelo di animali	Infezioni e Riniti
Antibiotici	Comorbidità
	Farmaci

Ruolo dello pneumologo:

- Supporto a tutte le azioni dei MMG/PLS
- Assicurare la diagnostica non eseguibile dai MMG/PLS
- Gestire le fasi di riacutizzazione fino al ripristino delle condizioni di stabilità
- Monitoraggio delle comorbidità.

Le comorbidità nell'asma

Adapted from Boulet, ERJ 2009

Test per il controllo dell'asma

Il Test per il controllo dell'Asma (ACT) è stato ideato da medici esperti di asma ed è stato scientificamente testato su centinaia di pazienti asmatici. Questo test fornisce ai pazienti ed ai loro medici curanti un punteggio utile a determinare quale è il livello di trattamento richiesto. Il test, adatto a chiunque soffre d'asma (persone dai 12 anni in su), è composto da 5 domande. Può essere utile compilare questo test in diversi momenti dell'anno.

1	Nelle ultime 4 settimane, quanto spesso l'asma ti ha impedito di fare tutto ciò che avresti fatto di solito al lavoro, a scuola/università o a casa?					Punti
	Sempre	Molto spesso	A volte	Raramente	Mai	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Nelle ultime 4 settimane, quanto spesso hai avuto il fiato corto?					
	Più di una volta al giorno	Una volta al giorno	Da 3 a 6 volte la settimana	Una o due volte la settimana	Mai	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Nelle ultime 4 settimane, quanto spesso i sintomi dell'asma (fischio, tosse, fiato corto, costrizione o dolore al petto) ti hanno svegliato/a di notte o più presto del solito al mattino?					
	4 o più notti la settimana	Da 2 a 3 notti la settimana	Una volta la settimana	Una o due volte	Mai	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	Nelle ultime 4 settimane, quanto spesso hai usato il farmaco di emergenza per inalazione o per aerosol (come Salbutamolo)?					
	3 o più volte al giorno	1 o 2 volte al giorno	2 o 3 volte la settimana	Una volta la settimana o meno	Mai	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Nelle ultime 4 settimane, quanto credi di aver tenuto sotto controllo la tua asma?					
	Per niente sotto controllo	Scarsamente sotto controllo	Abbastanza sotto controllo	Ben sotto controllo	Completamente sotto controllo	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐
						☐
	Nome _____					
	Data _____					
						Totale ☐

Gestione a lungo termine del paziente con asma

Impostare il piano di educazione (minimal advice).

Comprendente i concetti:

- Asma come malattia infiammatoria cronica persistente, che richiede lunghi periodi di trattamento;
- Importanza dello stile di vita:
 - Cessazione dal fumo;
 - Allontanamento da allergeni o altri fattori scatenanti noti;
 - Riduzione del peso negli obesi;
 - Attività fisica moderata;
- importanza della corretta modalità di assunzione dei farmaci inalatori;
- riconoscimento precoce e trattamento appropriato delle riacutizzazioni:
 - Piano scritto per valutare la gravità della riacutizzazione;
 - Piano scritto per l'uso di farmaci aggiuntivi;
 - Piano scritto per richiedere l'intervento medico.

Svolgere l'attività educativa

- Al momento della diagnosi.
- Ad ogni visita di controllo:
 - Verifica dell'aderenza al trattamento (numero di prescrizioni);
 - Verifica delle modalità di assunzione dei farmaci;
 - Sorvegliare su possibili interazioni con altri farmaci o patologie;
 - Individuare possibili fattori responsabili di riacutizzazioni o perdita di controllo dell'asma.

Migliorare l'aderenza del paziente al piano terapeutico:

- Favorire l'autogestione del paziente (nei buoni percettori).
- Consigliare l'uso di farmaci efficaci a bassa dose.
- Semplificare la terapia: unico inalatore, massimo due inalazioni al giorno.

Attivare la consulenza specialistica:

- Pazienti con asma non controllato sotto terapia da step 4.
- Pazienti con importanti comorbidità, da studiare e trattare (rinosinusite, poliposi nasale, reflusso gastro-esofageo, intolleranza all'aspirina).
- Pazienti per valutazione di immunoterapia specifica.
- Pazienti per valutazione utilizzo di farmaci biologici.
- Pazienti con sospetta asma professionale.
- Asmatici in attività sportiva agonistica.

IL Percorso Clinico-Assistenziale di cura nella ASL di Rieti

Il presente Percorso clinico-assistenziale di cura prevede una rete operativa che vede la forte collaborazione dei pediatri di famiglia e dei medici di medicina generale che operano sul territorio, la U.O.S.D. di Pediatria e Neonatologia dell'ospedale ed il team specialistico (allergologo pediatrico, pneumologo, dermatologo, otorinolaringoiatra, psicologo)

Il pediatra/MMG di base ha il compito di individuare il paziente con patologia respiratoria allergica sulla base dell'anamnesi, della valutazione clinica e, se possibile, con valutazione oggettiva della SO₂ tramite pulsossimetro al fine di stabilire il grado di gravità della malattia.

Il pediatra/MMG ha cura di mettere in atto nel proprio ambulatorio le misure terapeutiche per gestire la patologia acuta in base alla sua gravità e di discriminare i casi da inviare in ospedale. Il pediatra di famiglia/MMG fa una rivalutazione periodica del controllo della malattia, dell'aderenza alla terapia, della tecnica di utilizzo degli inalatori.

Inoltre il pediatra/MMG ha il compito di inviare il paziente con sospetto clinico allo specialista in allergologia pediatrica che provvederà ad eseguire gli esami per identificare i pazienti allergici attraverso esami di primo livello (Skin Prick Test) ed esami di secondo livello (dosaggio IgE specifiche e dosaggio allergeni molecolari CRD).

Il paziente viene quindi inviato ad eseguire accertamenti strumentali che prevedono per le alte vie respiratorie (rinofibrosopia e nei casi di discordanza tra esito dei prick test e sintomi clinici, il test di citologia nasale al momento possibile solo con invio in centri di 3° livello), per la diagnosi definitiva di asma il paziente viene inviato allo pneumologo ospedaliero (se bambino >5 aa) o al centro pediatrico per effettuare spirometria basale e test di broncodilatazione farmacologica.

Il percorso prevede inoltre la possibilità di avvalersi di un supporto psicologico già al momento dell'invio se necessario sulla base dell'anamnesi o lungo il percorso assistenziale qualora si renda necessario. Completato l'iter diagnostico il paziente torna allo specialista allergologo che provvede ad instaurare la terapia farmacologica necessaria e qualora possibile l'immunoterapia specifica. Il paziente entra in un percorso di follow up con controlli periodici in ambulatorio.

Sono inoltre previsti momenti di formazione con il supporto infermieristico per l'addestramento del paziente e dei genitori alla bonifica ambientale ad all'uso dei devices e dell'adrenalina auto iniettabile. Il monitoraggio della malattia è essenziale per raggiungere il controllo.

I pazienti vengono rivisti entro tre mesi dopo la visita iniziale e successivamente ogni 3-6 mesi in base alla gravità della malattia e poi ogni 12 mesi se raggiunto il controllo della malattia. Se asma complicata o resistente a terapia si considera invio presso centro di terzo livello per eventuale prescrizione di farmaco biologico.

Possibili indicatori di efficacia del percorso sono l'appropriatezza prescrittiva dei farmaci ed il livello di controllo dell'asma sulla base dei seguenti elementi:

- Frequenza dei sintomi diurni e notturni;

- Utilizzo di farmaci al bisogno;
- Limitazioni della vita quotidiana;
- Numero e gravità delle riacutizzazioni;
- Dosaggio ossido nitrico esalato (FENO).

Nell'intervallo tra le visite allergologiche di controllo è comunque previsto un monitoraggio da parte del pediatra di famiglia/MMG al fine di valutare l'andamento clinico, l'aderenza alla terapia ed il corretto uso dell'inalatore.

Al momento l'esecuzione della spirometria nei bambini con età < 5aa, del test di citologia nasale, misura del FENO richiede invio a Centro di 3° livello.

Flow Chart A: PCA Allergia respiratoria pediatrica, Ragionamento clinico, Reclutamento pazienti

Legenda Flow Chart A: PCA Allergia respiratoria pediatrica, Ragionamento Clinico. Reclutamento pazienti

V0: Presa di contatto con PLS-MMG-Specialista Territoriale.

I pazienti si rivolgono ai PLS-MMG ed agli specialisti territoriali.

A0: Gli operatori sanitari (PLS-MMG-Specialista Territoriale) avranno il compito di redigere una anamnesi patologica ed una visita medica preliminare al fine di individuare i pazienti con sospetto patologia allergica respiratoria.

Inoltre è importante che vengano acquisiti parametri oggettivi, almeno la misura delle SO₂, per poter inquadrare la gravità della patologia. Sarà compito degli operatori sanitari compilare le impegnative per la prima visita allergologica pediatrica qualora venga confermato il sospetto di allergia respiratoria.

V1: Prima visita allergologica pediatrica

1° Visita allergologico pediatrica:

A1 Si effettuano le seguenti prestazioni:

- Anamnesi fisiologica;
- Anamnesi allergologica familiare;
- Anamnesi ambientale;
- Anamnesi patologica prossima e remota (inquadramento secondo linee guida ARIA e GINA);
- Visita medica specialistica;
- Esecuzione : skin prick test per alimenti ed inalanti;
- Prick by prick con alimenti freschi;
- Richiesta di indagini sierologiche di 2° livello quali IgE specifiche ed indagine molecolare (CRD).

Al termine di questi esami preliminari lo specialista stabilisce se è confermato il sospetto di allergia respiratoria. In tal caso il paziente viene inviato ad effettuare una seconda valutazione allergologica in cui verranno prodotti gli esami ematici richiesti, altrimenti il paziente esce dal percorso.

V2: Seconda visita allergologica pediatrica

- Si effettua visita di controllo per valutare andamento clinico della malattia;
- Si prende visione degli esami ematici richiesti.
-

A2: Visite specialistiche a richiesta

Criteria per la richiesta di visite specialistiche:

- **Visita pneumologica**

Per completare la diagnosi di asma eseguire esami strumentali.

- **Visita psicologica**

In caso di segni di disagio psicologico o problematiche sociali e/o affettive.

- **Visita otorinolaringoiatrica**

Qualora vi sia discordanza tra i risultati dei test allergologici e sintomi clinici di rinite o sospetto di patologie ostruttive delle alte vie aeree.

A2a: Visita pneumologica

Viene richiesta qualora i sintomi respiratori siano compatibili con asma al fine di confermare la diagnosi e monitorizzare la malattia.

Si effettuano i seguenti esami strumentali:

- Spirometria basale;
- Test di broncodilatazione farmacologico (positivo se aumento del FEV1 >12%);
- Spirometria sotto sforzo nei casi in cui i sintomi siano indotti da esercizio fisico.

A2b: Visita psicologica

Consente di effettuare:

- Colloquio anamnestico (esordio del disturbo, storia familiare, rapporti sociali ed affettivi, andamento scolastico e/o lavorativo);
- Valutazione della riduzione della qualità di vita e livello di sofferenza associata;
- Motivazione al trattamento;
- Somministrazione di batteria di test.

A2c: Visita otorinolaringoiatrica

Consente di effettuare:

- Valutazione delle vie aeree;
- Rinofibroscopia per effettuare ispezione delle prime vie aeree al fine di escludere difetti anatomici o patologie ostruenti (poliposi, ipertrofia adenoidea, deviazioni del setto nasale, sinusite, etc.);
- Test di citologia nasale utile se esiste una discordanza tra i sintomi clinici ed i risultati dei test allergici (rinite allergica locale) o per fare diagnosi di altri tipi di rinite (NARES, NARESMA etc.).

A2d: Visita dermatologica

Viene richiesta in caso di presenza di Dermatite Atopica/Orticaria al fine di ottimizzare la cura generale del bambino e alleviare la condizione di malattia

V3 Rivalutazione allergologica pediatrica

A conclusione delle visite effettuate l'allergologo prende visione degli esami e delle consulenze effettuate e confermata la diagnosi di allergia respiratoria avvia un percorso terapeutico mirato in base alla patologia e della sua gravità.

Flow Chart Organizzativa
PCA Allergia respiratoria pediatrica - Reclutamento pazienti

**NOTE FLOW-CHART ORGANIZZATIVA, PCA ALLERGIA RESPIRATORIA PEDIATRICA
RECLUTAMENTO PAZIENTI**

V0 Procedura di reclutamento del paziente

<i>Operatore sanitario</i>	<i>Procedura\evento(cosa fa il professionista)</i>
Medico di medicina generale Pediatra di libera scelta Specialista territoriale	Invia il paziente con la sua ipotesi di diagnosi
<i>Documentazione prodotta</i>	Impegnativa
<i>Obiettivi</i>	Affidamento del paziente allo specialista
<i>Rischi correlati</i>	Nessuno
<i>Tempi</i>	Primo contatto con il paziente sul territorio

V1 Prima visita specialistica

<i>Operatore sanitario</i>	<i>Procedura\evento(cosa fa il professionista)</i>
Pediatra allergologo	Visita allergologica + Prick test + Richiesta indagini sierologiche
Infermiere	Terapia educativa/Verifica sull'utilizzo dei device e della corretta gestione dei fattori di rischio
<i>Documentazione prodotta</i>	Referto-impegnativa
<i>Obiettivi</i>	Individuazione pazienti allergici
<i>Rischi correlati</i>	Rare reazioni durante l'esecuzione dei prick test
<i>Tempi</i>	Durata: 30 minuti

V2 Seconda visita allergologica

<i>Operatore sanitario</i>	<i>Procedura\evento(cosa fa il professionista)</i>
Pediatra allergologo	Visita di controllo
Infermiere	Terapia educativa/Verifica sull'utilizzo dei device e della corretta gestione dei fattori di rischio
<i>Documentazione prodotta</i>	Referto
<i>Obiettivi</i>	Conferma sospetto allergia respiratoria
<i>Rischi correlati</i>	Nessuno
<i>Tempi</i>	Durata: 15 minuti

A2 Visite specialistiche

<i>Operatore sanitario</i>	<i>Procedura\evento(cosa fa il professionista)</i>
Pneumologo	Effettua visita pneumologica con esecuzione di spirometria basale e test di broncodilatazione farmacologica
Psicologo	Effettua colloquio anamnestico e clinico ed individua un percorso terapeutico
Otorino	Effettua visita ORL + Rinofibrosopia Test di citologia Nasale (Invio centro 3°livello)
Dermatologo	Visita dermatologica
<i>Documentazione prodotta</i>	Referto
<i>Obiettivi</i>	Diagnosi e monitoraggio dell'asma
Pneumologo	Individuazione disagio psicologico e prospettive terapeutiche
Psicologo	Diagnosi strumentale di patologie ostruttive delle prime vie aeree e studio della citologia nasale
Otorino	
Dermatologo	Valutazione e cura Dermatite Atopica al fine di minimizzarne gli effetti
<i>Rischi correlati</i>	Scarsa collaborazione del paziente pediatrico
<i>Tempi</i>	Visita pneumologica + spirometria: 30 minuti Visita ORL + Fibroscopia: 30 minuti Colloquio psicologico: 50 minuti Visita dermatologica: 20 minuti

V3 Rivalutazione allergologica pediatrica

OPERATORE SANITARIO	PROCEDURA\EVENTO(COSA FA IL PROFESSIONISTA)
Pediatra allergologo	Visita allergologica
Infermiere	Terapia educativa/Verifica sull'utilizzo dei device e della corretta gestione dei fattori di rischio
<i>Documentazione prodotta</i>	Referto
<i>Obiettivi</i>	Prescrizione terapia farmacologica ed immunoterapia specifica
<i>Rischi correlati</i>	Nessuno
<i>Tempi</i>	Durata: 15 minuti

Flow Chart B: PCA Allergia respiratoria pediatrica, Ragionamento Clinico,
Percorso a Bassa Complessità Assistenziale (BCA)

Legenda Flow Chart B: PCA Allergia respiratoria pediatrica, Ragionamento clinico, Percorso a Bassa Complessità Assistenziale (BCA)

Il percorso a BCA è destinato ai pazienti con asma intermittente (sintomi inferiori una volta/settimana) di gravità lieve moderata. Gli obiettivi del trattamento ambulatoriale sono quelli di consentire una gestione adeguata secondo le linee guida attuali dell'attacco acuto dell'asma da parte degli operatori sanitari operanti sul territorio (PLS/MMG/Specialista Territoriale) consentendo al paziente di non dover ricorrere all'accesso in ospedale.

Una rapida e attenta valutazione atta a stabilire la gravità dell'episodio rappresenta un momento prioritario e indispensabile per instaurare un piano razionale di interventi. A questo scopo risultano utili alcuni elementi anamnestici e clinici.

È da tener presente che, a volte, i sintomi clinici si correlano poco con la gravità dell'asma e pertanto è necessario integrarli con valutazioni oggettive (Tab. 1).

Parametri	Lieve	Moderato	Grave
Respiro corto	Mentre cammina	Mentre parla (nei lattanti pianto flebile e difficoltà ad alimentarsi)	A riposo
Parole tra due atti respiratori	Lieve 5-7	Moderato 3 - 5	Grave 0-2
Frequenza respiratoria	Normale	Aumentata	Aumentata
Wheezing	Fine espirazione	Espirazione	In/Espirazione
Uso muscoli accessori	No	Modesto	Notevole
Stato di coscienza	Lieve agitazione	Agitazione	Notevole agitazione
PEF (% del predetto)	> 80	60 – 80	< 60
Sat O2 (%)	> 95	91 - 95	< 91
PaO2 (mmHg)	90 – 100	60 – 90	<60
PaCO2 (mmHg)	< 45	< 45	> 45

Attacco Lieve

- Salbutamolo: inalazione, spray predosato (con distanziatore) 2-4 (200-400 mcg) spruzzi, o nebulizzazione (0.15 mg/Kg/dose, 1 goccia = 0.25 mg), ripetibile se necessario ogni 20 min fino ad un massimo di 3 dosi
 - a) Risposta soddisfacente (risposta stabile per 60 mm. dopo l'ultima somministrazione, di stress respiratorio lieve, SaO2 >95%, PEF o FEV1 >80%):
Non necessario il ricovero, il paziente può continuare la somministrazione di salbutamolo ogni 4-6 ore e poi, con frequenza progressivamente minore, per circa 7 giorni.

Per i pazienti già in trattamento con steroidi inalatori, continuare ad utilizzarli alle loro dosi abituali.

b) Risposta insoddisfacente e/o ricaduta entro la prima ora: continuare la somministrazione di Salbutarnolo e aggiungere uno steroide per os.

Prednisone 1-2 mg/Kg/die (max 40 mg/dose) in 1-2 somministrazioni,

o

Betametasone 0.1-0.2 mg/Kg/die (max 4 mg/dose) in 1-2 somministrazioni;

b 1) se miglioramento, continuare con Salbutarnolo come sopra e steroidi per os per altri 3-5 giorni;

b2) se non migliora, trattare come episodio moderato.

Attacco Moderato

- Salbutarnolo per inalazione: spray predosato (con distanziatore) 2-4 (200-400 mcg) spruzzi, fino a 10 spruzzi nelle forme più gravi o nebulizzazione (0.15 mg/Kg/dose, 1 goccia = 0.25 mg), ripetibile se necessario ogni 20 min., fino ad un massimo di 3 dosi in associazione con Ipratropium bromuro:
spray predosato (con distanziatore), 4-8 spruzzi (80-160 mcg) o nebulizzazione: 125-250 mcg (<4 aa) e 250-500 mcg (>4 aa)
- Steroide per os :
Prednisone 1-2 mg/Kg/die (max 40 mg/dose) in 1-2 somministrazioni o
Betametasone 0.1-0.2 mg/Kg/die (max 4 mg/dose) in 1-2 somministrazioni

a) Risposta soddisfacente: ridurre progressivamente la frequenza di somministrazione di Salbutamolo ed Ipratropium, eventualmente continuare solo Salbutamolo e steroidi per os

b) Risposta insoddisfacente:

Ricovero.

Ripetere 3 dosi di Salbutamolo in un'ora, in associazione con Ipratropium bromuro

Continuare CORTICOSTEROIDI PER OS

Somministrare O₂

b 1) se miglioramento, ridurre progressivamente il trattamento in base alla risposta clinica

b2) se non migliora trattare come un attacco grave

Indicazioni per il ricovero

Insufficienza respiratoria.

- Gravità dei parametri clinici (dispnea importante, wheezing in-espilatorio, uso della muscolatura accessoria, cianosi, torace silente, stato mentale alterato), in particolare dopo il trattamento broncodilatatore;

- SaO₂ <92%, in particolare dopo trattamento broncodilatatore;
- PEF <60% (valori riferiti a quelli teorici o, se conosciuto, al valore personale migliore), in particolare dopo broncodilatatore;
- Presenza di complicanze (es. pneumotorace, pneumomediastino, atelettasie, polmonite).

Criteri più rigidi devono essere invece adottati per pazienti osservati nel pomeriggio o di notte, con precedenti episodi asmatici gravi, con "asma instabile", con ridotta percezione dei sintomi, con scarso sostegno familiare o con difficoltà a raggiungere l'ospedale in caso di ulteriore aggravamento.

B1 Presa in carico-visita medica

Il paziente viene preso in carico dal PLS/MMG/Specialista Territoriale di riferimento che provvede a raccogliere l'anamnesi e a sottoporre il paziente a visita medica

B2 Trattamento

Il medico di riferimento prescrive la terapia a seconda del grado di gravità dell'attacco asmatico e fornisce consigli per la corretta esecuzione della terapia, invia il paziente a domicilio prevedendo un contatto telefonico o in ambulatorio per valutare la risposta alla terapia

B3 Controlli periodici ambulatoriali

Il PLS/MMG/Specialista Territoriale prevede dei controlli periodici per valutare le condizioni di salute del paziente e il controllo della malattia prevedendo in caso di modifica della gravità l'inserimento del paziente nel percorso a MCA / ACA o ricovero ospedaliero.

**Flow Chart Organizzativa, PCA Allergia respiratoria pediatrica,
Percorso a Bassa Complessità Assistenziale (BCA)**

NOTE FLOW CHART B: PCA ALLERGIA RESPIRATORIA PEDIATRICA, RAGIONAMENTO ORGANIZZATIVO PERCORSO A BASSA COMPLESSITA' ASSISTENZIALE (BCA)

B1 Presa in carico

<i>Operatore sanitario</i>	<i>Procedura\evento(cosa fa il professionista)</i>
Medico di medicina generale Pediatra di libera scelta Specialista territoriale	Anamnesi – visita- misura sol/ terapia educativa/Verifica sull'utilizzo dei device e della corretta gestione dei fattori di rischio
<i>Documentazione prodotta</i>	Referto
<i>Obiettivi</i>	Identificazione paziente BCA
<i>Rischi correlati</i>	Nessuno
<i>Tempi</i>	20 minuti

B2 Trattamento

<i>Operatore sanitario</i>	<i>Procedura\evento(cosa fa il professionista)</i>
Medico di medicina generale Pediatra di libera scelta Specialista territoriale	Prescrizione terapia/ terapia educativa/Verifica sull'utilizzo dei device e della corretta gestione dei fattori di rischio
<i>Documentazione prodotta</i>	Prescrizione terapia (ricetta)
<i>Obiettivi</i>	Trattamento episodio acuto da linea guida
<i>Rischi correlati</i>	Non risposta alla terapia
<i>Tempi</i>	10 minuti

B3 Controlli periodici ambulatoriali

<i>Operatore sanitario</i>	<i>Procedura\evento(cosa fa il professionista)</i>
Medico di medicina generale Pediatra di libera scelta Specialista territoriale	Controllo stato della malattia/ terapia educativa/Verifica sull'utilizzo dei device e della corretta gestione dei fattori di rischio
<i>Documentazione prodotta</i>	Referto
<i>Obiettivi</i>	Controllo della malattia
<i>Rischi correlati</i>	Uscita volontaria del paziente dal percorso
<i>Tempi</i>	20 minuti

**Flow Chart C: PCA Allergia respiratoria pediatrica - Ragionamento Clinico,
Percorso a Media Complessità Assistenziale (MCA)**

Legenda Flow Chart C: PCA Allergia respiratoria pediatrica. Ragionamento Clinico. Percorso a Media Complessità Assistenziale (MCA)

Questo percorso è destinato ai pazienti con asma persistente lieve moderata che hanno sintomi più di una volta a settimana ma inferiore a una volta al giorno e sintomi notturni maggiori di due volte al mese o maggiori di una volta a settimana con sintomi che limitano le attività quotidiane. Questi pazienti sono meritevoli di una terapia di fondo e di un follow up periodico da parte del centro allergologico

C1 Presa in carico – Visita Specialistica- Terapia

I pazienti pediatrici con asma persistente vengono presi in carico da servizio di allergologia pediatrica. Il pediatra allergologo dopo aver preso visione dei referti delle varie visite specialistiche e degli esami strumentali provvede a prescrivere, secondo le linee guida attuali, una terapia medica e /o un immunoterapia.

C2 Rivalutazione del paziente MCA

Dopo 3 mesi dall'inizio della terapia prescritta (o prima dei tre mesi in caso di esacerbazioni ricorrenti/condizioni ambientali e/o sociali inadeguate) il paziente viene rivalutato nell'ambulatorio di allergologia pediatrica ed esegue una misurazione del feno. Se il paziente presenta un asma controllato viene rivalutato in ambulatorio allergologico dopo sei mesi (visita + feno), se l'asma non è controllato il paziente viene rivalutato dopo 3 mesi dalla modifica della terapia (visita + feno).

C3 Follow Up

Se il paziente presenta un adeguato controllo della malattia verrà sottoposto a follow up dopo 6/12mesi e quindi affidato al pediatra di libera scelta o MMG che avrà cura di seguire il paziente e di trattare eventuali episodi acuti di grado lieve moderato. Se non si riesce a controllare l'asma il paziente entra nel percorso ACA o eventualmente a ricovero.

**Flow Chart Organizzativa, PCA Allergia respiratoria pediatrica,
Percorso a Media Complessità Assistenziale MCA**

NOTE FLOW CHART C: PCA ALLERGIA RESPIRATORIA PEDIATRICA, RAGIONAMENTO ORGANIZZATIVO, PERCORSO A MEDIA COMPLESSITA' ASSISTENZIALE (MCA)

C1 Presa in carico

<i>Operatore sanitario</i>	<i>Procedura\evento(cosa fa il professionista)</i>
Pediatra Allergologo	Visita + Terapia
Infermiere	Terapia educativa/Verifica sull'utilizzo dei device e della corretta gestione dei fattori di rischio
<i>Documentazione prodotta</i>	Referto
<i>Obiettivi</i>	Gestione secondo linee guida (asma persistente)
<i>Rischi correlati</i>	Non risposta alla terapia
<i>Tempi</i>	20 minuti

C2 Rivalutazione

<i>Operatore sanitario</i>	<i>Procedura\evento(cosa fa il professionista)</i>
Pediatra Allergologo	Visita + Feno
Infermiere	Terapia educativa/Verifica sull'utilizzo dei device e della corretta gestione dei fattori di rischio
<i>Documentazione prodotta</i>	Referto
<i>Obiettivi</i>	Valutare effetto terapia
<i>Rischi correlati</i>	Uscita volontaria del paziente dal percorso
<i>Tempi</i>	20 minuti

C3 Follow Up

<i>Operatore sanitario</i>	<i>Procedura\evento(cosa fa il professionista)</i>
Pediatra Allergologo	Visita + Feno
Infermiere	Terapia educativa/Verifica sull'utilizzo dei device e della corretta gestione dei fattori di rischio
<i>Documentazione prodotta</i>	Referto
<i>Obiettivi</i>	Controllo della malattia
<i>Rischi correlati</i>	Uscita volontaria del paziente dal percorso
<i>Tempi</i>	20 minuti

Flow Chart D: PCA Allergia respiratoria pediatrica, Ragionamento Clinico, Percorso a Alta Complessità Assistenziale (ACA)

Legenda Flow Chart D: PCA Allergia respiratoria pediatrica, Ragionamento Clinico, Percorso a Alta Complessità Assistenziale (ACA)

Questo percorso è destinato ai pazienti pediatrici con asma non controllato nonostante adeguamento della terapia di fondo o con asma intrattabile.

D1 Invio centro di 3° livello

Il paziente viene inviato a un centro di pneumologia pediatrica

D2 Test diagnostici trattamenti

Il paziente viene sottoposto nel centro di 3° livello ad accertamenti diagnostici supplementari che consentono di confermare la diagnosi o di fare una diagnosi differenziale con altre patologie. Inoltre si potrà fare ricorso a farmaci biologici (Omalizumab)

D3 Dimissione- Follow Up

Il paziente può essere rinvio al centro allergologico di partenza per il follow up o in caso di necessità al ricovero ospedaliero.

NOTE FLOW CHART D: PCA ALLERGIA RESPIRATORIA PEDIATRICA, RAGIONAMENTO ORGANIZZATIVO, PERCORSO A ALTA COMPLESSITA' ASSISTENZIALE (ACA)

D1 Invio centro 3°livello

<i>Operatore sanitario</i>	<i>Procedura\evento(cosa fa il professionista)</i>
Pediatra Allergologo	Invio centro di 3°livello
<i>Documentazione prodotta</i>	Impegnativa
<i>Obiettivi</i>	Trattamento asma resistente
<i>Rischi correlati</i>	Uscita volontaria del paziente dal percorso
<i>Tempi</i>	15 minuti

D2 Trattamento

<i>Operatore sanitario</i>	<i>Procedura\evento(cosa fa il professionista)</i>
Pediatra Pneumologo	Visita + Prescrizione farmaco biologico
<i>Documentazione prodotta</i>	Referto
<i>Obiettivi</i>	Terapia 2° livello
<i>Rischi correlati</i>	Mancata risposta alla terapia
<i>Tempi</i>	30 minuti

D3 Follow Up

<i>Operatore sanitario</i>	<i>Procedura\evento(cosa fa il professionista)</i>
Pediatra Allergologo	Controlli periodici Verifica sull'utilizzo dei device e della corretta gestione dei fattori di rischio
<i>Documentazione prodotta</i>	Referto
<i>Obiettivi</i>	Controllo della malattia
<i>Rischi correlati</i>	Uscita volontaria del paziente dal percorso
<i>Tempi</i>	15 minuti

**FLOW CHART E: PCA Allergia respiratoria pediatrica, Ragionamento Clinico.
Percorso in regime ospedaliero (HCA)**

Legenda Flow Chart E: PCA Allergia respiratoria pediatrica, Ragionamento Clinico, Percorso in regime ospedaliero (HCA)

Il paziente con attacco grave (saturazione O₂ inferiore al 91% ed insufficienza respiratoria) viene inviato al Pronto Soccorso dove si attiva il percorso per il paziente pediatrico.

E1 Presa in carico- Valutazione

Il paziente giunto in PS è sottoposto a triage al fine di attribuire un codice di gravità:

- Se codice rosso il paziente viene gestito in PS dal personale del DEA , dal pediatra e dal rianimatore;
- Se codice giallo il paziente viene valutato dal medico del DEA e stabilizzato il PS con la consulenza del pediatra;
- Se codice verde il paziente viene inviato direttamente in pediatria.

E2 Valutazione-Terapia

In pediatria l'infermiera accoglie il paziente ed effettua la rilevazione dei parametri vitali ed allerta il medico di guardia. Il paziente viene sottoposto a visita medica ed effettua la terapia prescritta dal pediatra.

Dopo la rivalutazione :

- Se miglioramento il paziente viene avviato a domicilio con terapia scritta e controllo dal PLS/MMG;
- Se non miglioramento il paziente viene trattenuto in OBIP per 6/36 ore.

E3 Dimissione controllo ambulatoriale

Dopo la dimissione il paziente viene affidato a PLS, MMG, Specialista Territoriale che provvedono a effettuare controllo clinico ambulatoriale nei tempi indicati alla dimissione.

E4 Rivalutazione

Dopo la rivalutazione durante l'osservazione breve in pediatria:

- Se miglioramento viene inviato a domicilio;
- Se non miglioramento ricovero in pediatria.

Flow Chart Organizzativa, PCA Allergia respiratoria pediatrica,
Percorso in regime ospedaliero (HCA)

NOTE FLOW CHART E: PCA ALLERGIA RESPIRATORIA PEDIATRICA, RAGIONAMENTO ORGANIZZATIVO, PERCORSO IN REGIME OSPEDALIERO (HCA)

E2 Visita reparto pediatrico

<i>Operatore sanitario</i>	<i>Procedura\evento(cosa fa il professionista)</i>
Pediatra ospedaliero	Visita medica e prescrizione terapeutica
<i>Documentazione prodotta</i>	Referto
<i>Obiettivi</i>	Corretta gestione dell'attacco d'asma in ambito ospedaliero
<i>Rischi</i>	Ricovero non appropriato
<i>Tempi</i>	Durata:20 minuti

E3 Visita ambulatorio territoriale

<i>Operatore sanitario</i>	<i>Procedura\evento(cosa fa il professionista)</i>
MMG/PLS/SPEC. TER	Effettua visita medica ambulatoriale e prescrive terapia domiciliare. Verifica sull'utilizzo dei device e della corretta gestione dei fattori di rischio
<i>Documentazione prodotta</i>	Prescrizione scritta
<i>Obiettivi</i>	Corretta gestione domiciliare del paziente con attacco d'asma
<i>Rischi</i>	Ridotta compliance del paziente
<i>Tempi</i>	Durata:20 minuti

PCA ALLERGIA RESPIRATORIA PEDIATRICA
INDICATORI DI STRUTTURA, PROCESSO ED ESITO

NUMERO	INDICATORI DI STRUTTURA
1	Numero di MMG-PLS-Specialisti territoriali coinvolti/ su totale MMG-PLS-Specialisti territoriali
2	Numero di specialisti ospedalieri coinvolti
3	Numero pazienti inviati dagli operatori territoriali
4	Numero pazienti attualmente presi in carico
5	Ore complessive di attività ambulatoriale

NUMERO	INDICATORI DI PROCESSO
1	Numero di pazienti con diagnosi confermata di allergia respiratoria / su totale dei casi inviati
2	Numero di pazienti che hanno interrotto il percorso diagnostico terapeutico (<i>Drop out</i>) / su totale pazienti reclutati
3	Numero di pazienti che hanno completato il Follow up / su totale pazienti reclutati

NUMERO	INDICATORI DI ESITO
1	Percentuale di pazienti con asma controllato/ su totale dei pazienti presi in carico
2	Riduzione accessi in pronto soccorso
3	Adeguatezza prescrittiva dei farmaci nel rispetto del PCA
4	Riduzione riacutizzazioni /anno per paziente reclutato nel PCA
5	Riduzione ricoveri per asma
6	Miglioramento della qualità della vita